

О НАРУШЕНИИ  
ЗАКОНА СЛЕДУЕТ  
НЕМЕДЛЕННО  
СООБЩИТЬ  
РАБОТОДАТЕЛЮ  
ИЛИ В СЛУЖБУ  
ОХРАНЫ!



## РАБОЧЕЕ МЕСТО - ЗОНА СВОБОДНАЯ ОТ КУРЕНИЯ

### ГДЕ ЗАКОН УСТАНОВЛИВАЕТ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ?

На рабочих местах и в рабочих зонах, расположенных, например, в помещениях административно-офисных зданий:

- органов государственной власти и местного самоуправления,
- социальных служб,
- производственных цехов,
- заводов,
- организаций, предоставляющих услуги широкого спектра.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №108 от 13.04.2016 г., в Чувашской Республике установлены **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КУРЕНИЯ В ПЯТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ:**

- на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;
- на расстоянии менее чем 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- в подземных и наземных пешеходных переходах;
- в границах территорий скверов, парков.

### ГДЕ РАЗРЕШАЕТСЯ КУРИТЬ?

Только на открытом воздухе, только за пределами зданий, где размещены рабочие места и рабочие зоны.

### КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ КУРЯТ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ?

■ РОСПОТРЕБНАДЗОР

■ ГОСПОЖНАДЗОР



## **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:**

### **КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ РАКА:**

Курение приводит к развитию рака ротовой полости, гортани, глотки, лёгкого, пищевода, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря, желудка, шейки матки, острого миелоидного лейкоза.

Риск развития рака лёгкого у курильщиков увеличивается в 20 раз по сравнению с некурящими.

### **КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:**

Риск смерти от коронарной болезни сердца у курящих людей увеличивается в 4 раза.

Несмотря на лечение, 25% мужчин и 38% женщин умирают в течение года после инфаркта миокарда, если продолжают курить.

### **КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЛЁГКИХ,** включая хронический бронхит и эмфизему легких; рак легких, губы и горла.

Риск умереть от хронического бронхита или эмфиземы легких у курильщиков в 5 раз выше, чем у тех, кто не курит.

### **КУРЕНИЕ ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ:**

- Курение может вызвать развитие стойкой импотенции.
- Курение приводит к бесплодию, у курящих женщин при беременности - к отслойке плаценты, задержке развития плода и снижению веса новорожденного.
- Курение женщинами во время беременности увеличивает в 4 раза риск развития внезапной детской смерти.

### **КУРЕНИЕ ПАГУБНО ОТРАЖАЕТСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ.**

---

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 2019-2024  
НА ПУТИ К ЦЕЛИ 80+**